

Русская теория эфирной физики. Основные положения

Антонов В.М. Липецк

antonov@stu.lipetsk.ru

В Русской теории чётко определены следующие положения:

- * первородное вещество – эфир;
- * количество элементарных частиц – одна;
- * вид элементарной частицы – шарик (диаметр $3.1 * 10^{-13}$ м; инерция $1.82 * 10^{-31}$ кг);
- * характер частицы – неделимая;
- * количество взаимодействий – одно;
- * характер взаимодействия – контактное давление;
- * агрегатное состояние эфира – сыпучее;
- * законы взаимодействия – классическая механика без дальнего действия; исключения не допускаются;
- * физическое пространство (наша метagalaktika) – скопление эфира в пределах видимости;
- * утверждается существование других метagalaktik;
- * Вселенная – абсолютная пустота, в которой находятся независимые метagalaktiki;
- * условие возникновения атомарного мира – столкновение метagalaktik;
- * текущее столкновение нашей метagalaktiki с соседней – за созвездиями Ориона и Кита;
- * энергия атомов черпается из энергии столкновения метagalaktik;
- * вид атома – торовый вихрь;
- * сечение вихря – три эфирных шарика;
- * условие существования атомных вихрей – высокое эфирное давление ($1.62 * 10^{24}$ Па); при этом условии каждый прилегающий к вихрю эфирный шарик перепрыгивает через пары шариков вихря;
- * разновидность атомов определяется различным скручиванием торовых вихрей;
- * условие слипания шнуров торовых вихрей – пониженное давление эфира между ними;
- * электрон – элементарный обрывок вихря, состоящий из трёх вращающихся эфирных шариков;
- * электрическое поле – пространство с переменным парциальным давлением электронов;
- * магнитный шнур – соосно расположенные и вращающиеся в одном направлении электроны;
- * магнитное поле – шнур магнитных шнуров с одним направлением вращения;
- * фотон – бегущий косинусоидальный прогиб эфирной среды; амплитуда фотона – около двух диаметров эфирных шариков;
- * в прозрачных средах фотоны огибают атомы, что создаёт иллюзию уменьшения скорости света;
- * гравитационное поле – эфирная среда с переменным давлением;
- * причина возникновения гравитационных полей вокруг планет и звёзд – распад атомов внутри них, в результате чего высвобождается пустота; её заполняет эфир, устремляющийся к планетам и звёздам со всех сторон;
- * устойчивая форма центростремительного потока эфира – плоский экваториальный вихрь;
- * инерционная масса тела определяется суммарной инерцией эфирных шариков, образующих атомы тела;
- * гравитационная масса тела – объём абсолютной пустоты в нём;
- * вес тела – произведение объёма пустоты на градиент эфирного давления;
- * атомы газов пульсируют и создают вокруг себя пульсирующие поля, предотвращающие их сближение;
- * спектральные явления в газах – резонансное поглощение фотонов и излучение их на той же частоте.

Подробности на <http://antonov.314159.ru>